

QCM – ACIDES AMINÉS, PROTÉINES ET ENZYMOLOGIE - Corrigé

Q1. Réponses A C E

- A. VRAI. Les protéines assurent l'essentiel des fonctions biologiques cellulaires, notamment enzymatiques, structurales, de transport et de signalisation.
- B. FAUX. A, U, C et G sont les quatre bases de l'ARN, alors que les protéines sont des polymères d'acides aminés et non de bases azotées.
- C. VRAI. Un acide α -aminé possède classiquement un carbone α lié à NH_2 , COOH , H et à un radical R variable.
- D. FAUX. La glycine n'appartient ni exclusivement à la série D ni à la série L car son carbone α porte deux hydrogènes et n'est donc pas chiral.
- E. VRAI. L'ADN est défini par quatre bases A, T, C et G, tandis que les protéines sont construites à partir de 20 acides aminés naturels.

Q2. Réponses A B C E

- A. VRAI. La décarboxylation enlève le CO_2 du groupement carboxylique d'un acide aminé et forme une amine, comme l'histidine transformée en histamine.
- B. VRAI. La synthèse de glutamine à partir du glutamate correspond à une amidation consommant de l'ATP et catalysée par la glutamine synthétase.
- C. VRAI. La liaison peptidique unit le COOH α d'un acide aminé au NH_2 α d'un autre et l'enchaînement de ces liaisons forme la structure primaire protéique.
- D. FAUX. La transamination est un transfert du groupement amine vers un α -cétoacide et nécessite le phosphate de pyridoxal, tandis que la libération d'ammoniac correspond à une désamination.
- E. VRAI. La phosphorylation porte sur les groupements hydroxyle des résidus Ser, Thr et Tyr et constitue un mécanisme réversible majeur de régulation enzymatique.

Q3. Réponses A C D

- A. VRAI. Le tropocollagène est l'unité structurale élémentaire du collagène et il est constitué de trois chaînes polypeptidiques entrelacées.
- B. FAUX. Chaque chaîne du tropocollagène est une hélice gauche et leur association forme une triple hélice droite, pas l'inverse.
- C. VRAI. Le collagène contient environ une glycine tous les trois résidus et présente une forte teneur en proline.
- D. VRAI. Les acides aminés modifiés caractéristiques sont la 4-hydroxyproline, la 3-hydroxyproline et la 5-hydroxylysine, et certaines hydroxylysines peuvent être glycosylées.
- E. FAUX. Les molécules de tropocollagène mesurent environ 300 nm de long et 1,4 nm de diamètre, et non l'inverse.

Q4. Réponses A C E

- A. VRAI. Un pont disulfure intracaténaire unit deux fonctions thiol de cystéines situées sur une même chaîne polypeptidique après son repliement.
- B. FAUX. Les 7 brins β du domaine de type immunoglobuline sont disposés en feuillets antiparallèles et non parallèles.

- C. VRAI. Chaque chaîne légère et chaque chaîne lourde de l'immunoglobuline G possède un domaine variable participant à la reconnaissance et à la fixation de l'antigène.
- D. FAUX. Le repliement des hélices α et des feuillets β en domaines relève de l'organisation tridimensionnelle intrachaine, alors que la structure quaternaire correspond à l'association de plusieurs sous-unités protéiques.
- E. VRAI. Le segment inclus dans le cœur hydrophobe de la bicouche lipidique est enrichi en résidus d'acides aminés apolaires afin de stabiliser l'insertion membranaire.

Q5. Réponses A B C

- A. VRAI. En Western blot, l'anticorps primaire reconnaît spécifiquement une petite région antigénique de la protéine appelée épitope.
- B. VRAI. La révélation repose classiquement sur un anticorps secondaire fixé à l'anticorps primaire et rendu détectable par un colorant, un fluorophore ou un système de chimioluminescence.
- C. VRAI. Le test ELISA est une variation clinique du Western blot adaptée à des protéines en solution avec une détection par colorimétrie.
- D. FAUX. L'immunohistochimie renseigne aussi sur la localisation intracellulaire de la protéine, comme noyau ou cytoplasme, ainsi que sur une surexpression ou une sous-expression.
- E. FAUX. La cryo-microscopie électronique fournit des données expérimentales à partir desquelles un modèle moléculaire 3D est reconstruit, et non une image 3D directe.

Q6. Réponses A D

- A. VRAI. Les enzymes sont définies comme des catalyseurs biologiques ayant un pouvoir catalytique important et une grande spécificité de substrat.
- B. FAUX. Une enzyme ne modifie pas l'équilibre d'une réaction car elle accélère la vitesse aller et la vitesse retour exactement dans le même facteur.
- C. FAUX. Le substrat est la molécule qui entre dans la réaction pour être transformée, tandis que la molécule qui apparaît au cours de la réaction est le produit.
- D. VRAI. Les enzymes fonctionnent en solution aqueuse dans des conditions de température et de pH très douces.
- E. FAUX. Pour une réaction réversible $S \rightleftharpoons P$, la constante d'équilibre est $K = [P]/[S] = k_1/k_2$ et non l'inverse.

Q7. Réponses B D E

- A. FAUX. Le site actif occupe une part relativement réduite du volume total de l'enzyme et non la majeure partie.
- B. VRAI. Le site actif est une entité tridimensionnelle constituée par le rapprochement de groupements fonctionnels lors du repliement de la chaîne polypeptidique.
- C. FAUX. Dans le modèle de reconnaissance dynamique, la complémentarité complète apparaît seulement après la liaison du substrat par ajustement induit.
- D. VRAI. Les acides aminés auxiliaires participent à l'ajustement induit alors que les acides aminés de contact assurent la liaison au substrat et la catalyse.
- E. VRAI. Au site actif, l'OH de la sérine, le SH de la cystéine et le noyau imidazole de l'histidine sont des groupements riches en électrons pouvant agir comme nucléophiles.

Q8. Réponses A C D

- A. VRAI. La réaction catalysée par la lactate déshydrogénase est bien l'oxydation du lactate en pyruvate avec réduction concomitante du NAD^+ en $\text{NADH} + \text{H}^+$.
- B. FAUX. Les 5 isoenzymes ont toutes un poids moléculaire total de 140 000 Da et diffèrent par la combinaison de 4 sous-unités M et H, pas par leur masse totale.
- C. VRAI. La LDH1 est l'isoenzyme H4, à prédominance cardiaque, et sa proportion plasmatique normale est d'environ 20 %.
- D. VRAI. Lors d'un infarctus, la nécrose myocardique libère la forme H4 cardiaque dans le plasma où elle peut représenter environ 50 %.
- E. FAUX. La LDH5 correspond à la forme M4 et oriente vers une origine musculaire ou hépatique, alors que les formes associées au cerveau sont LDH2 et LDH3.

Q9. Réponses A B D

- A. VRAI. Pour un temps donné, la quantité de produit formé augmente proportionnellement avec la concentration en enzyme, ce qui découle de la relation $v = dP/dt$ et de la proportionnalité $v \propto [E]$.
- B. VRAI. Le modèle de Michaelis-Menten décrit une enzyme globulaire à un seul site catalytique, par opposition aux enzymes allostériques à comportement plus complexe.
- C. FAUX. Dans ce schéma, v_2 correspond à la dissociation du complexe ES vers $E + S$, tandis que la formation du produit P correspond à v_3 .
- D. VRAI. L'état stationnaire impose que la vitesse de formation du complexe ES soit égale à sa vitesse de disparition, soit $v_1 = v_2 + v_3$, donc $v_1 - v_2 = v_3$.
- E. FAUX. La définition correcte est $K_m = (k_2 + k_3)/k_1$, issue de l'équilibre entre formation et destruction du complexe ES.

Q10. Réponses A D

- A. VRAI. Dans l'inhibition non compétitive réversible, l'enzyme peut former à la fois ES, EI et ESI, ce qui signifie que substrat et inhibiteur peuvent être liés simultanément.
- B. FAUX. Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'analogie structurale avec le substrat et se fixe sur un site distinct du site de fixation du substrat.
- C. FAUX. L'inhibition non compétitive laisse le K_m inchangé car l'affinité enzyme-substrat n'est pas modifiée, tandis que la V_{max} apparente diminue.
- D. VRAI. L'AZT ne possède pas de groupement OH en 3' du 2'-désoxyribose, ce qui bloque la formation de la liaison phosphodiester 3'-5' et arrête l'élongation.
- E. FAUX. La diminution de la V_{max} apparente s'explique par une baisse du K_{cat} , puisque $V_{max} = K_{cat} \times [E]_T$ et qu'un inhibiteur non compétitif diminue le K_{cat} .