

QCM – BIOCH – GLUCIDES ET LIPIDES - Corrigé

Q1. Réponses A D E

- A. VRAI. Les glucides sont décrits comme présents dans toutes les cellules sous forme d'oses, de diholosides et de polyosides.
- B. FAUX. Le glycogène et l'amidon sont des polysaccharides de réserve énergétique, alors que le rôle structural concerne plutôt des composés comme la cellulose.
- C. FAUX. Lors d'une oxydation, le nombre d'oxydation du carbone augmente, par exemple du méthanol vers le formaldéhyde puis l'acide formique.
- D. VRAI. L'oxydant est l'espèce chimique qui gagne ou capte des électrons au cours de la réaction d'oxydoréduction.
- E. VRAI. Les glucides participent à la formation de métabolites essentiels incluant des nucléotides, des vitamines et des coenzymes comme le FAD et le NAD⁺.

Q2. Réponses B C D

- A. FAUX. Dans une projection de Fischer, la chaîne carbonée principale est représentée verticalement et non horizontalement.
- B. VRAI. Les conventions de Fischer placent les liaisons verticales en arrière du plan et les liaisons horizontales en avant du plan.
- C. VRAI. Le carbone placé en haut correspond à celui portant le groupement fonctionnel le plus oxydé, qu'il s'agisse d'une fonction aldéhyde ou cétone.
- D. VRAI. La projection de Fischer est une représentation plane d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques avec les carbones asymétriques dans le plan.
- E. FAUX. L'isomérisation de constitution correspond à une différence de nature ou d'ordre des liaisons, alors qu'une différence de configuration spatiale relève de la stéréoisomérisation.

Q3. Réponses A C D

- A. VRAI. Les oses ont bien pour formule générale $C_nH_{2n}O_n$ avec $3 \leq n \leq 9$, et les monosaccharides les plus fréquents en biologie sont les pentoses et les hexoses.
- B. FAUX. La dihydroxyacétone est bien un triose parmi les plus petits oses mais elle ne possède aucun centre chiral, ce qui empêche de lui attribuer une configuration D ou L au sens strict.
- C. VRAI. L'homologation selon Fischer ajoute un carbone asymétrique portant un alcool secondaire immédiatement après le carbone carbonyle.
- D. VRAI. D-érythrose et D-thréose ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique non définissant la série, ici le C2.
- E. FAUX. L'interconversion aldose-cétose entre D-glucose et D-fructose est facile en solution acide ou alcaline via un énediol, mais elle est défavorisée dans la cellule.

Q4. Réponses A C E

- A. VRAI. La mutarotation est définie comme la variation du pouvoir rotatoire d'une solution d'ose lors de l'interconversion des anomères α et β jusqu'à l'équilibre.
- B. FAUX. Une molécule chirale ne possède pas d'élément de symétrie et ne se superpose pas à son image dans un miroir, ce qui est l'inverse d'une molécule ayant un plan de symétrie.

- C. VRAI. Pour une molécule portant n carbones asymétriques, le nombre maximal de stéréoisomères est de 2^n .
- D. FAUX. À l'équilibre en solution, le D-glucose est constitué d'environ 36 % de forme α et 64 % de forme β .
- E. VRAI. Les conformations proviennent de la rotation autour des liaisons C–C et il existe des conformères plus stables que d'autres, comme la forme chaise du glucopyranose.

Q5. Réponses A C E

- A. VRAI. La phosphorylation d'un ose est une substitution d'un H par un phosphate et une kinase peut transférer ce groupement à partir de l'ATP, comme pour la formation du glucose-6-phosphate.
- B. FAUX. L'hexokinase phosphoryle un hexose et non spécifiquement un pentose, tandis que le ribose-5-phosphate est seulement cité comme autre ose phosphorylé.
- C. VRAI. Les osamines gardent la cyclisation, la mutarotation et le pouvoir réducteur des oses, et acquièrent en plus le caractère acido-basique et la réactivité de la fonction amine.
- D. FAUX. L'acétylation transforme l'osamine en N-acétylosamine, comme la glucosamine en N-acétylglucosamine, sans régénérer l'ose initial.
- E. VRAI. L'oxydation de la fonction alcool primaire du glucose forme un acide carboxylique de type acide uronique, en particulier l'acide glucuronique.

Q6. Réponses A C E

- A. VRAI. L'amidon est un polyside homogène dont la chaîne est constituée d'un seul type d'ose, l' α -D-glucose.
- B. FAUX. L'amylose ne représente que 15 à 30 % de la masse de l'amidon, tandis que la fraction majoritaire à 70 à 85 % est l'amylopectine.
- C. VRAI. L'amylopectine est formée de segments linéaires de résidus de glucose liés en $\alpha(1-4)$ avec des points de branchement en $\alpha(1-6)$.
- D. FAUX. Le glycogène ressemble à l'amylopectine par ses liaisons $\alpha(1-4)$ et $\alpha(1-6)$, mais il est plus ramifié avec une branche environ tous les 10 résidus contre 20 à 30 pour l'amylopectine.
- E. VRAI. Chez les vertébrés, le glycogène hépatique contribue au maintien de la glycémie pour l'ensemble de l'organisme alors que le glycogène musculaire est consommé localement par le muscle.

Q7. Réponses A C D

- A. VRAI. Les GAG sont des hétéroglycanes constitués de chaînes linéaires dont la longueur varie de quelques dizaines à plusieurs milliers de résidus d'oses ou dérivés d'oses.
- B. FAUX. Les GAG de structure sont liés de façon covalente à des protéines à l'exception de l'acide hyaluronique, qui s'associe par des liaisons ioniques faibles.
- C. VRAI. L'acide hyaluronique est présent dans les tissus conjonctifs et forme avec d'autres GAG un gel macromoléculaire très visqueux assurant lubrification des surfaces et absorption des chocs.
- D. VRAI. L'héparine appartient aux GAG de sécrétion, est sécrétée par les mastocytes et exerce un effet anticoagulant par liaison à l'antithrombine, inhibiteur de la thrombine.
- E. FAUX. Le motif répété de l'acide hyaluronique associe l'acide β -D-glucuronique et la N-acétyl- β -D-glucosamine, et non du galactose avec de l'acide iduronique.

Q8. Réponses A D

- A. VRAI. Les déterminants antigéniques ABO des hématies correspondent à des motifs osidiques portés par des glycoprotéines et des glycolipides de membrane.
- B. FAUX. Le groupe AB exprime les antigènes A et B sur les hématies et ne possède donc aucun anticorps anti-A ni anti-B dans le plasma.
- C. FAUX. Le groupe O possède des anticorps anti-A et anti-B et ne peut donc recevoir que des hématies du groupe O.
- D. VRAI. Les lipides sont définis comme un ensemble hétérogène de molécules hydrophobes ou amphiphiles insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques.
- E. FAUX. Les triacylglycérides assurent surtout le stockage énergétique, alors que les principaux lipides membranaires sont les glycérophospholipides, les sphingolipides et le cholestérol.

Q9. Réponses A B D

- A. VRAI. Les triacylglycérols sont des esters neutres dépourvus de tête polaire, ce qui les rend fortement hydrophobes, apolaires et insolubles dans l'eau.
- B. VRAI. Les triacylglycérols correspondent à la forme majoritaire des graisses ingérées et représentent environ 95 % des lipides alimentaires.
- C. FAUX. Les triacylglycérols sont stockés dans des gouttelettes lipidiques et ne forment pas de bicouche membranaire car ils sont apolaires et dépourvus de tête hydrophile.
- D. VRAI. Les glycérophospholipides sont amphiphiles avec une tête polaire et des queues apolaires, ce qui permet leur organisation en bicouche dans les membranes biologiques.
- E. FAUX. Un acide phosphatidique associe un glycérol, deux acides gras et un phosphate, et non un seul acide gras.

Q10. Réponses A C D

- A. VRAI. Les sphingolipides sont des lipides membranaires sans glycérol dont l'unité de base est le céramide, constitué de sphingosine liée à un acide gras.
- B. FAUX. Dans le céramide, l'acide gras est fixé sur la fonction amine de la sphingosine par une liaison amide et non par une liaison ester.
- C. VRAI. Le substituant hydrophile des sphingolipides peut correspondre à une phosphocholine, un glucose, un galactose ou une chaîne d'osides.
- D. VRAI. Les sphingomyélines constituent environ 85 % des sphingolipides et sont des constituants majeurs de la gaine de myéline assurant l'isolement des axones.
- E. FAUX. Les gangliosides sont des glycosphingolipides acides impliqués dans la transduction du signal, le système immunitaire et les antigènes des groupes sanguins.

Q11. Réponses ACE

- A. VRAI
- B. FAUX. Les deux oses engagent leur carbone anomérique (liaison osido-oside) : le saccharose n'est pas réducteur et ne présente pas de mutarotation.
- C. VRAI
- D. FAUX. C'est une $\beta(1-4)$ D-galactosidase. Le nom de la famille vient de l'ose 1, celui qui engage son carbone anomérique, ici le galactose.
- E. VRAI

Q12. Réponses ACD

- A. VRAI. C'est l'acide oléique (18 C, 1 double liaison en C9).
- B. FAUX. En numérotant à partir du C ω , la double liaison commence au carbone 9 : c'est un ω 9 (n-9).
- C. VRAI
- D. VRAI. Le point de fusion est de +13 °C pour l'acide oléique, contre +70 °C pour l'acide stéarique.
- E. FAUX. C'est un acide faible, ionisé (COO⁻) à pH 7 dans la cellule.